

INFORMATIE VOOR VROUWEN DIE VEOZA™ GEBRUIKEN

(fezolinetant) tabletten 45 mg



VEOZA™^v is een geneesmiddel zonder hormonen dat wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige opvliegers en nachtzweeten (vasomotorische symptomen) die verband houden met de menopauze.¹



Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

OVER DEZE BROCHURE

Uw arts heeft u VEOZA™ (stofnaam fezolinetant) voorgeschreven.

U vindt in deze brochure informatie over wat fezolinetant is, waarvoor het wordt gebruikt, hoe het werkt en welke mogelijke bijwerkingen er zijn.


Achterin deze brochure staan internetlinks die verwijzen naar organisaties waar u meer informatie kunt vinden over de menopauze of hieraan gerelateerde onderwerpen.

Zorg ervoor dat u de bijsluiter leest die bij uw medicijn wordt geleverd. Als u verdere vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw arts of apotheker.


WAT IS FEZOLINETANT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?¹

Fezolinetant is een geneesmiddel zonder hormonen voor vrouwen in de overgang (menopauze), bedoeld om matige tot ernstige opvliegers en nachtzweeten (vasomotorische symptomen) die tijdens de menopauze kunnen optreden, te verminderen.


HOE WERKT HET GENEESMIDDEL?¹



Vóór de menopauze is er een evenwicht tussen vrouwelijke geslachtshormonen genaamd 'oestrogenen' en een eiwit 'neurokinine B' (NKB), dat het temperatuurcontrolecentrum van de hersenen regelt.



Gedurende de menopauze vermindert de hoeveelheid oestrogeen, waardoor het evenwicht met neurokinine B (NKB) uit balans raakt. Dit beïnvloedt hoe uw lichaam uw temperatuur regelt en kan matige tot ernstige opvliegers en nachtzweeten (vasomotorische symptomen) veroorzaken.



Door de neurokinine B (NKB)-binding in uw temperatuurcontrolecentrum te blokkeren, vermindert fezolinetant het aantal en de hevigheid van opvliegers en nachtzweeten.

HOE GEBRUIKT U FEZOLINETANT?¹

Neem één tablet per dag
zoals voorgeschreven door uw arts.



Neem uw fezolinetant-tablet elke dag op ongeveer dezelfde tijd, met of zonder voedsel. Het kan handig zijn een herinnering in te stellen op uw telefoon om u een seintje te geven wanneer het tijd is om fezolinetant in te nemen.

Slik de tablet in zijn geheel door met wat vloeistof.



Kauw niet op de tablet en vermaal of breek deze ook niet.



ALS U MEER FEZOLINETANT INNEEMT DAN ZOU MOETEN

Als u meer tabletten heeft ingenomen dan u is voorgeschreven of als iemand anders per ongeluk uw tabletten inneemt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Symptomen van een overdosis kunnen onder meer hoofdpijn, misselijkheid of een tintelend of prikkelend gevoel zijn.

ALS U VERGEET FEZOLINETANT IN TE NEMEN

Als u vergeet uw geneesmiddel in te nemen, neem dan de gemiste dosis zo snel mogelijk op dezelfde dag in en doe dit ten minste 12 uur voor de volgende geplande dosis. Is de volgende geplande dosis minder dan 12 uur later, dan moet u de gemiste dosis niet innemen. Ga de volgende dag verder met uw normale schema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u meerdere doses mist, vertel dit dan aan uw arts en volg het gegeven advies op.

ALS U STOPT MET HET INNEMEN VAN FEZOLINETANT

Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel, tenzij uw arts u dat zegt. Stop niet met uw behandeling, zonder overleg met uw arts.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN FEZOLINETANT¹

- Zoals elk geneesmiddel kan ook fezolinetant bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Sommige bijwerkingen (bijv. beschadiging van de lever) kunnen ernstig zijn.
Als u een of meer van de volgende bijwerkingen krijgt, vertel dat dan onmiddellijk aan uw arts: moeheid, jeukende huid, gele verkleuring van de huid en ogen, donkere urine, lichtgekleurde ontlasting, misselijkheid of overgeven, gebrek aan eetlust en/of maagpijn. Deze symptomen kunnen wijzen op beschadiging van uw lever (hoe vaak deze bijwerking voorkomt, is niet bekend, omdat dit met de beschikbare gegevens niet kan worden bepaald).
- De meest gemelde bijwerkingen (die kunnen voorkomen bij minder dan 1 op de 10 fezolinetant-gebruikers) zijn:



Diarree



Verhoging van bepaalde leverenzymen (ALAT of ASAT), zoals vastgesteld door bloedonderzoek



Moeilijk slapen (insomnia)



Buikpijn

Voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, wordt er wat bloed bij u afgenomen om de werking van uw lever te controleren. Deze controle moet tijdens de eerste drie maanden van de behandeling maandelijks worden herhaald, en daarna met regelmatige tussenpozen als uw arts dit nodig vindt.¹

SPREEK MET UW ARTS OF APOTHEKER VOORDAT U FEZOLINETANT INNEEMT ALS U:¹

- Op dit moment een leverziekte of leverproblemen heeft.
- Nierproblemen heeft.
- Momenteel of eerder borstkanker of een andere oestrogeengerelateerde kanker heeft gehad.
- Op dit moment hormoonvervangende therapie met oestrogeen (geneesmiddelen die worden gebruikt om symptomen van oestrogeentekort te behandelen) gebruikt.
- Een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen heeft.

ANDERE MEDICIJNEN¹

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen of supplementen gebruikt, onlangs heeft genomen of van plan bent te nemen, inclusief alternatieve therapieën zonder voorschrift.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of geeft u borstvoeding? Dan mag u dit geneesmiddel niet innemen. Dit geneesmiddel is alleen bestemd voor gebruik door vrouwen in de menopauze. Als u zwanger wordt terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, moet u onmiddellijk stoppen met het innemen ervan en moet u dit met uw arts bespreken. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten effectieve niet-hormonale anticonceptie gebruiken.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan de afdeling Vigilantie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), website: www.eenbijwerkingmelden.be. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze brochure of bijsluiter staan.

HOE VERDER?

We hopen dat u voldoende informatie heeft om te starten met fezolinetant.

Als u nog aanvullende vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker die u graag zal adviseren.

Voor meer informatie over fezolinetant raadpleeg de bijsluiter in de verpakking.

AANVULLENDE INFORMATIE

Wilt u meer weten over de overgang, dan kunnen de volgende websites of organisaties u mogelijk helpen:

Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG)
(www.visuele-e-gids-menopauze.be)

The Belgian Menopause Society (BMS)
(www.menopausesociety.be)
Brochures over de menopauze

Beswic
(<https://beswic.be/nl/blog/menopauze-bespreikbaar-maken-op-het-werk>)
Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk

Menofocus
(www.menofocus.be)
Vereniging van Belgische Menopauzeconsulenten

Gezondheid en wetenschap
(www.gezondheidenwetenschap.be)
Richtlijnen voor patiënten over de menopauze

Referentie: 1. VEOZA™ Patiëntenbijsluiter.

Disclaimer

In deze brochure krijgt u uitleg over het gebruik van fezolinetant. Het advies van de arts of apotheker is altijd leidend. Deze brochure is geen vervanging van de bijsluiter van fezolinetant. De bijsluiter bevat richtlijnen voor een juist gebruik. Voordat u fezolinetant gaat gebruiken, moet u de bijsluiter daarom aandachtig doorlezen. Neem de bijsluiter regelmatig opnieuw door wanneer u met een nieuwe verpakking begint, in verband met mogelijke veranderingen. Heeft u vragen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er onverhoopt onjuistheden in staan, dan is Astellas niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van handelingen die zijn gebaseerd op de inhoud van deze brochure.

Astellas® en het vliegende ster-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Astellas Pharma Inc. Verstrekt als een dienst voor patiënteneducatie door Astellas.

MAT-BE-VEO-2025-00020 / March 2025

V.U.: O. Wedemeier, MSc, Astellas Pharma B.V.
Sylviusweg 62 | 2333 BE Leiden | Nederland.

